

NUOVO PROTOCOLLO DIAGNOSTICO-ASSISTENZIALE DEL GLNBI PER IL BAMBINO ADOTTATO ALL'ESTERO

C. Adami Lami⁵, O. Gabrielli¹, M. Zaffaroni², F. Cataldo³, P. Valentini⁶, G. Veneruso⁵, G. Zavarise⁴

¹ *Ancona*

² *Novara*

³ *Palermo*

⁴ *Negrar, Verona*

⁵ *Firenze*

⁶ *Roma*

Durante il III Convegno Nazionale ISMU-GLNBI-SIMM (Milano 17-18 /5/07) i responsabili dei centri di riferimento pediatrici per l'adozione internazionale del GLNBI hanno rivalutato il protocollo diagnostico-assistenziale concordato nel 2002 al 58° Congresso della SIP e approvato dalla Commissione Adozioni internazionali.

Le modifiche riguardano solo alcuni esami di laboratorio: non sono stati ritenuti indispensabili in fase di screening i seguenti esami: sideremia, transferrinemia , reticolociti , IgE, Immunoglobuline frazionate.

Queste modifiche consentono una riduzione di spesa per il SSN e/o di ticket.

PROTOCOLLO DIAGNOSTICO-ASSISTENZIALE PER L'ACCOGLIENZA SANITARIA DEL BAMBINO ADOTTATO ALL'ESTERO (GLNBI 2007)

Anamnesi: ricostruzione dell'iter adottivo della coppia e del vissuto preadottivo del bambino con riferimento alla famiglia di origine (componenti, condizioni sociali, abitudini di vita , motivi dell'abbandono), all'istituto/i di accoglienza (situazione igienico-sanitaria, modalità relazionali-educative, scolarizzazione) , alle modalità dell'adozione , allo sviluppo fisico e neuroevolutivo, patologie pregresse, vaccinazioni documentate.

Esame obiettivo : valutazione clinica generale.

Indagini di laboratorio : glicemia, creatininemia, esame emocromocitometrico e formula leucocitaria, fosfatasi alcalina, transaminasi , protidogramma, ferritinemia , VES, Markers epatite B e C , TPHA, anticorpi anti HIV 1-2, esame parassitologico feci (su 3 campioni), esame delle urine, intradermoreazione di Mantoux.

In relazione al paese di provenienza effettuare:

dosaggio TSH, FT4 (Bielorussia, Ucraina) ; anticorpi anticicercario (America Latina, Africa, Asia); anticorpi antitossocara (Europa dell'Est, America Latina, India).

Indagini di approfondimento:

Esame radiologico del torace se Mantoux positiva.

Hb elettroforesi e/o Dosaggio G6PD : in base ai risultati dell'esame emocromocitometrico.

Visite specialistiche : tutte, secondo necessità.

Programma vaccinale : valutazione del titolo anticorpale per i vaccini o rivaccinazione dalla prima dose secondo il protocollo di vaccinazioni previsto in Italia.

Bibliografia :1) Chen LH. Preventing infectious diseases during and after international adoption. Ann.Intern.Med.2003;139:371-378